



# Consignes aux patients

## Avant l'intervention

- Il est conseillé de prendre 3 x 2 comprimés par jour de « Traumeel » pendant les 3 jours qui précèdent l'intervention, pour diminuer l'apparition de bleus. Le « Traumeel » doit être pris à jeun.
- Le jour de l'opération, il est conseillé de ne pas porter de maquillage ou de vernis et de ne pas utiliser de crème de jour.
- Le jour de l'opération, il est conseillé de ne pas porter de lentilles de contact.
- Le jour de l'opération, il est conseillé de ne pas porter de bijoux.
- Le jour de l'opération, il est conseillé de porter un vêtement large et confortable et qui ne nécessite pas, pour être enlevé, d'être passé par dessus la tête.
- Le matin avant l'intervention, les cheveux doivent être lavés avec un savon antiseptique de type Hibiscrub, Uni-Cura ou Betadermyl (en pharmacie).

## Après l'intervention

- Il est interdit de conduire pendant les 24 heures qui suivent l'opération.
- En cas de douleur, il est conseillé de prendre du Dafalgan(paracétamol) à raison de maximum 1 comprimé de 1 g, 4 fois par jour.
- Le pansement placé juste après l'opération doit être maintenu jour et nuit durant 10 jours ; il sera enlevé avec les sutures.
- Pendant ces 10 jours, les plaies doivent rester protégées de l'eau et du shampoing.
- Après que les sutures aient été enlevées, un bandeau doit être porté la nuit pendant 3 semaines.

# QUESTION?

[webinfo@beclinic.com](mailto:webinfo@beclinic.com)

+32 2 309 6000