



Richtlijnen voor de patiënt

Voor de ingreep:

- Het is aangeraden om een maand voor de ingreep te licht te etenstoppen met roken, en de gezichtshuid te behandelen met Chiroxy-crème (Auriga).
- Voor de ingreep is het 10 dagen lang verboden om aspirine of ontstekingsremmers in te nemen.
- Het is aangeraden om tijdens de 3 dagen voor de ingreep 3 x 2 tabletten per dag "Traumeel" in te nemen, om onderhuidse bloedingstoringen te verminderen. "Traumeel" moet op een nuchtere maag worden ingenomen.
- Het is aangeraden om "Nutrimonium" voedingssupplementen te gebruiken tijdens de maand voor de ingreep.

- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen make-up of nagellak te dragen en geen dagcrème te gebruiken.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen contactlenzen te dragen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen juwelen te dragen.

Na de ingreep:

- Na de ingreep is het 24 uur lang verboden een auto te besturen.
- Tijdens de 5 dagen na de ingreep is het aangeraden 3 x 2 tabletten per dag "Traumeel" in te nemen, om onderhuidse bloeduitstortingen te verminderen.
- Als u pijn voelt is het aangeraden om Dafalgan (paracetamol) in te nemen a rato van 1 tablet van 1g, 4 maal per dag.
- De hechtingen worden beschermd door steri-strips (pleisters) die op het oog worden aangebracht net na de ingreep. Deze pleisters mogen niet nat worden, en worden 4 à 7 dagen na de ingreep verwijderd.
- Een zwelling en blauwe plekken blijven ongeveer een week zichtbaar, en zullen daarna vervagen.
- Er kan een gevoel van hinder optreden, en de ogen kunnen 2 à 3 dagen lang gaan tranen.
- Om het oedeem en de bloeduitstortingen te verminderen is het aangeraden om 3 dagen lang met het hoofd lichtjes hoger op twee hoofdkussens te slapen.
- Om het oedeem en de bloeduitstortingen te verminderen moeten koude kompressen worden aangebracht op de oogleden, waarbij rechtstreeks contact tussen de huid en het ijs vermeden moet worden.

- Na het verwijderen van de hechtingen kunnen de bloeduitstortingen en het litteken met make-up gecamoufleerd worden.
- Het is aangeraden om “Nutrimonium” voedingssupplementen te gebruiken tijdens de maand na de ingreep, om het genezingsproces te versnellen.

VRAAG?

webinfo@becclinic.com

+32 2 309 6000